



Stichting Veteranenziekte

RESTVERSCHIJNSELEN NA EEN LEGIONELLA BESMETTING



WAAROM DIT ONDERZOEK ?

- Overlevenden van een legionellabesmetting een STEM geven
- ONWETENDHEID over de restverschijnselen na een legionellabesmetting.



1999 - 2019



WIE ZIJN ER ONDERVRAAGD?

85 mensen


→ legionella besmetting gehad



WAAR IS DE BESMETTING OPGELOPEN?


Waar denkt u de besmetting te hebben opgelopen?

85 reacties



Op welke locatie denkt u de besmetting te hebben opgelopen?

81 reacties






ZIEKENHUISVERBLIJF

Hoe lang heeft u in ziekenhuis gelegen?


85 reacties



- Korter dan een week
- 1-3 weken
- 4-8 weken
- langer dan 8 weken
- Niet in het ziekenhuis gelegen

Heeft u in coma gelegen, en zo ja hoe lang?

82 reacties



- Nee
- Ja, korter dan een week
- Ja, 1-2 weken
- Ja, 3-4 weken
- Ja, langer dan 4 weken



RESULTATEN

10% **geen** last van restverschijnselen
90% **wel** last van restverschijnselen

Opsomming Restverschijnselen

- 55% vermoeidheidsklachten
- 53% pijn aan spieren/gewrichten
- 24% concentratieproblemen
- 21% problemen met geheugen of vergeetachtig
- 17% psychische klachten
- Ook 36% andere ziekte of diagnose na de legionella
- Enkele overige restverschijnselen zoals moeite met spreken, sneller vatbaar bacteriën of schrikkerig



DE DUUR EN DE ERNST van de RESTVERSCHIJNSELEN

DUUR RESTVERSCHIJNSELEN

- 20% 0 tot 5 jaar last van de restverschijnselen.
- 80% langer dan vijf jaar last van de restverschijnselen.

ERNST RESTVERSCHIJNSELEN

- 34% geen of weinig last in dagelijks leven.
- 66% gemiddeld tot extreem veel last in dagelijks leven.

- 32% geen of weinig last in het werkende leven
- 68% gemiddeld tot extreem veel last in werkende leven.
- 25% van deze groep werken onmogelijk geworden.



AANPAK WERKGEVER en BEDRIJFSARTS

WERKGEVER

- 75,4% werkgevers gemiddeld tot extreem goed
- 24,6% werkgevers slecht tot extreem slecht

BEDRIJFSARTS

- 62,6% bedrijfsartsen gemiddeld tot extreem goed
- 37,4% bedrijfsartsen slecht tot extreem slecht



AANPAK HUISARTS en ZIEKENHUIS

HUISARTS

Aanpak huisarts bij diagnose

→ 44% reactie gemiddeld goed tot extreem goed.

→ 56% reactie slecht tot extreem slecht.

Aanpak huisarts bij nabehandeling

→ 62% nabehandeling gemiddeld tot extreem goed.

→ 38% nabehandeling slecht tot extreem slecht.

ZIEKENHUIS

Aanpak ziekenhuis bij behandeling

→ 83% ziekenhuis gemiddeld goed tot extreem goed

→ 17% ziekenhuis gemiddeld slecht tot extreem slecht



OPSTELLING GGD

Aanpak GGD

- 70% benaderd door de GGD
- 30% niet benaderd door GGD


Van de benaderden:

- 40% GGD *gemiddeld goed tot extreem goed.*
- 60% GGD *slecht tot extreem slecht.*



OVERLEVENDEN EEN STEM GEVEN

5 terugkomende thema's



Ervaringen

Ideeën

Gevoelens

Tips



THEMA 1: ONWETENDHEID OVER LEGIONELLA

Algemeen: *niet genoeg bekendheid.*

→ Geen bekendheid over moeten laten doorlopen van eigen douches.

Vrienden/kennissen:

“Oh, een legionella besmetting... Heb je besmette kip gegeten dan?”

Reisbureau:

“Tja mevrouw, dan had u op vakantie maar flesjes water moeten drinken, in plaats van kraanwater.”



THEMA 2: ONWETENDHEID OVER DE RESTVERSCHIJNSELEN

Restverschijnselen in het algemeen:

- Fysiek
- Mentaal

Werkgever:

“Ah, de besmetting is over. Dan kunt u begin volgende week gewoon weer aan het werk, toch?”



THEMA 3: HANDELEN VAN DE HUISARTS

Belang juist handelen huisarts enorm groot

“Met “griep” en paracetamol weer naar huis gestuurd”

“Adequaat handelen huisarts heeft leven gered “



THEMA 4: NABEHANDELING IN HET ZIEKENHUIS

- Wel check-up(s) bij de longarts met longfoto's etc.
- Maar wel vrijwel direct na behandeling naar huis gestuurd



THEMA 5: GGD

- “GGD geen contact opgenomen”
- “Bij contact: alleen nagetrokken waar opgelopen”
- “Als uitgevonden waar opgelopen, gebeurt niks mee”